

コロナウイルス arXiv(20) 2020年12月6日

中公新書『新型コロナの科学-パンデミック、そして共生の未来へ』の再校のため、arXiv (19) から1ヶ月間が空いてしまいました。幸いなことに、10月下旬の初校の直前に民間臨時調査会の報告書を読むことができましたので、政策決定の過程を書き込みました。現在進行形のコロナを執筆対象としているので、「Added in proof」の数ページを用意してもらいました。このため、再校時(11月下旬)に90%以上有効ワクチンを追加し、明るい見通しで本を終えることができました。光栄なことに、山中伸弥先生から推薦の文章をいただきました。なお、中公新書はすでにAmazon, 紀伊國屋などで予約を受け付けております。340ページの新書版としてはかなり分厚ですが、940+税です。

目次と要約

コロナウイルス arXiv(20)2020/12/6

1. ワクチン

ワクチンについては、すでにニュースで詳細が報告されているので、別な観点から書きました。

2. G614V 変異ウイルスの感染力

スパイクタンパクの D614G 変異ウイルス(ヨーロッパ型ウイルス)が、3月以来世界の流行を支配しています。細胞レベル、動物レベルの感染実験から、D614G 変異により感染力が高くなっていることが明らかになりました。

3. ミンクコロナの遺伝子変異

デンマークの国立研究所から、ミンクコロナの変異は、スパイクタンパクの変異であること、回復者血漿の抗体が効かないことが報告されました。

4. PCR 検査政策

民間臨時調査会の報告書により、厚労省がPCR検査の拡大に反対する内部文書を作成し、国会議員に説明にまわっていたことが明らかになりました。

5. 市川家国先生のアメリカ便り (1)

アメリカに滞在中の市川家国先生から、アメリカのコロナ状況の報告が届きました。

6. コロナ秀歌、コロナ秀句、コロナ川柳

資料提供：

市川家国：Vanderbilt 小児科学名誉教授、公正研究推進協議会 (APRIN) 理事

コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信 (<https://www.covid19-yamanaka.com/cont2/main.html>)』に転載されております。

転送は自由です。

1. 新型コロナウイルスワクチン

最初に、ワクチンがどれだけの効果があったかを、天然痘、ポリオ、麻疹を例に示そう。

図1は、ワクチン開発(中央の縦線)前後のロンドンの天然痘死亡者(図1上)、アメリカのポリオ死亡者(中)とアメリカの麻疹患者(下)である。いずれも、ワクチン開発により、劇的に死亡者あるいは患者が減少している。天然痘は、1980年のソマリア人の患者を最後に撲滅された。ポリオは1979年以来アメリカで感染者は出ていない。麻疹も30万人から80万人の感染者が出ていたのに、1963年にワクチンの接種が始まると激減した。

図1


ワクチンの劇的効果。

上:天然痘

中:ポリオ

下:麻疹

Our World in data
(Oxford大)*。



* Roser, M. (2020.7.20) Our history is a battle against the microbes: we lost terribly before science, public health, and vaccines allowed us to protect ourselves, Our World In Data :

<https://ourworldindata.org/microbes-battle-science-vaccines>

同じような効果を新型コロナウイルスでも期待できるであろうか。11月9日(月)に Pfizer が 90%有効のワクチン開発を発表すると、1週間後の 11月16日(月)には Moderna が、94.5%有効というデータを発表した。その2日後の 11月18日(水)には、Pfizer は 95%有効というデータを追加発表した*。いずれにしても、驚くべき速さでワクチンが開発されたことになる。その効果も驚くほどである。副反応も軽微ということなので、相当期待できるであろう。ただ、長期間の副反応は、まだ明らかになっていないので、先行して実施するアメリカ、イギリスの結果を注意深く観察する必要がある。

*両社のワクチンの詳細は、それぞれのホームページに詳しく掲載されている。

Pfizer, Moderna のワクチンは共に、新型コロナウイルスのゲノムである mRNA を用いている。mRNA は細胞に取り込まれ、細胞のタンパク製造システムによってはじめてタンパクとなる。このために開発されたのが、Drug delivery system (DDS) として脂質ナノ粒子である。脂質で覆われていれば、mRNA は安定に細胞に取り込まれる。細胞内で、mRNA からスパイクタンパクが合成され、細胞表面にでて、抗原と認識され、免疫が成立するというわけである(図 2)。このワクチン製造の最大のノウハウは脂質ナノ粒子である。保存温度 (Pfizer マイナス 80 度、Moderna マイナス 20 度) が異なるのは、用いた脂質ナノ粒子の違いによる。


図 2

不安定な mRNA を守り、細胞に届けるために、脂質ナノ粒子が DDS として使われる。

Kaiser, J. Science Nov.16,2020

doi:10.1126/science.abf7422


[Temperature concerns could slow the rollout of new coronavirus vaccines | Science | AAAS \(sciencemag.org\)](#)



ワクチンの開発状況は、NYタイムズの「Coronavirus Tracker」*に分かりやすくまとめられている(図 3)。Pfizer も Moderna もまだ承認されていないので Phase 3 のなかに分類されている(12月2日現在)。なお、Limited の7つのワクチンはいずれも Phase 3 を待たずに使用されている中国とロシアのワクチンである。

図3

ワクチンの開発状況。12月2日現在、承認を受けたワクチンはないが、Pfizer, Moderna のワクチンが左端の Approved にランクされるのは時間の問題である。NY Times から*



* Corum, J. et al. (2020.10.27) Coronavirus Vaccine Tracker, NY Times : <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>

2. ヨーロッパ型 D614V 変異

arXiv (18) で、武漢型からヨーロッパ型への変異は、614番タンパク(スパイクタンパク)のアスパラギン酸(D)がグリシンに変わった「D614G変異」であることを紹介した。この変異が第二波となって世界に感染を広げた。D614Gが世界に広がる経過とその感染力に関する論文3報をいかに紹介する。

Cellの論文から、日本を含むアジアの地図を図4と5に示す*。PCR検出のデータから、感染者に感染している変異ウイルス量は、変異していないウイルス(D614)に比べて多いと思われる。

図4

3月までは武漢型のD614(茶色)が感染のほとんどを占めていたが、3月11-20日になるとヨーロッパ型のG614(紺色)に置き換わった。





図5

2月から5月までの日本の変異ウイルス分布。茶色:D614 武漢型、紺色:G614 ヨーロッパ型
* Korber et al Cell July 20,



2020 [:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043](https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043)

D614V ウイルスが、ヒトの肺細胞、コウモリの細胞、センザンコウの細胞に対して感染性が高いことが示された。特にヒト肺細胞に対しては、ヨーロッパ型 D614G は、武漢型の D614 よりも 6 倍感染性が高かった*。

*Yurkovetskiy et al Cell September 15 2020 <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.032>

東大医科研とウイソコンシン大学に研究室をもつ河岡義裕のチームは、D614G ウイルスの感染性を細胞および動物実験で確認した*。D614G と変異していない野生型の D614 ウイルスに感染したハムスターのケージを健康なハムスターのケージと隣り合わせに置き、感染が起こるかどうかを見た実験では、D614G ウイルスは、8 ペアのうち 5 ペアが 2 日目に感染していたのに対し、変異のないウイルスでは感染は見られなかった。D614G 変異ウイルスの感染性が高くなっていることが確認された。

*Hou, Y. J. et al Science 10.1126 November 12, 2020

[SARS-CoV-2 D614G variant exhibits efficient replication ex vivo and transmission in vivo | Science \(sciencemag.org\)](https://doi.org/10.1126/science.1261126)

これらのデータから、武漢型に変わって 3 月から世界中に広がった D614G 変異ウイルスは、感染性が高くなっていることが細胞レベルと動物の感染実験で確認された。第三波は、この D614G にさらに変異が加わった 20A.EU1 ウイルスであると思われる(arXiv19 参照)。日本の第三波のウイルスゲノムの解析はまだ発表されていない。

3. ミンクコロナウイルスゲノムの変異

前号(arXiv19)で、デンマークで発見されたミンクコロナウイルスについて報告した。ヒトからミンクに感染し、さらにミンクからヒトに感染した。このため、デンマーク政府は 1,700 万匹とも言われるミンクを殺処分にして、大きなニュースになった。このウイルスの変異についてデンマーク政府の研究所から短い報告があったので紹介する。

変異は、スパイクのレセプター結合領域 (RBD) に起こっていた。453 番のアミノ酸がチロシン (Y) からフェニルアラニン (F) に置き換わった Y453F 変異であった。このため、ACE2 への結合が高まった可能性がある。さらに、この変異をもったミンクコロナは、ヒトの回復者血漿に含まれている抗体が効きにくかった。デンマーク政府が、ミンクの殺処分を急いだのは、ワクチンが効かない可能性を心配したからと思われる。

* [Mink-cluster-5-short-report_AFO2 \(ssi.dk\)](https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2020-09-01)