

## コロナウイルス arXiv(32) 2021年9月13日 黒木登志夫

今回も、前報に続いて、ワクチンについて報告します。今回のワクチンの話題は次の4点です。さらに、コロナに感染すると、たとえ無症状でも、術後30日以内の術後死が高いため、7週間は待たねばならないという大規模国際研究の結果を開催します。

### A. ブースター接種の効果

現在のワクチンプロトコルにもう1回プラスして接種を行うとブースター効果が得られます。実際に3回目の接種が、デルタ感染予防の効果のあることが、イスラエルの臨床実験で明らかになりました。現在のブースター接種を巡る議論をまとめました。

### B. 夢のワクチン

もし、すべてのコロナウイルスとその変異株に効果があり、20年以上持続するような「Dream vaccine」ができれば、パンデミックは早く解消するでしょう。そのような夢のワクチン開発の研究が進んでいます。シンガポール国立大学が発表して SARS 生存者の血清分析は、夢のワクチンが夢でないことを示唆しています。

### C. ワクチン接種は努力義務

政府は、ワクチンを打ちたくない人は打たなくてもよいと繰り返し、注意を呼びかけています。予防接種法の条文を調べたところ、ワクチンは「努力義務」と書いてありました。努力すべき義務なのです。デルタ株が主流となった今、ワクチン接種率を100%近くにする以外に解決法はありません。

### D. ファイザーワクチンはどのようにして作られるか

私のように大学の研究室で細々と実験をしていた者には、何億人分というワクチンを作るなど見当もつきません。NY Times に、製造過程の解説記事が出ていましたので、今度の中公新書の原稿をお届けします。

### E. COVID-19 感染者の手術は直ぐにはできない。感染後7週間待つ。

あまり知られていませんが、COVID-19 感染者は術後30日以内の術後死亡が非常に高いという事実があります。術後死を防ぐためには、感染後7週間待たなければならぬことが、大規模国際共同研究から明らかになりました。弘前大学医学部麻酔科の廣田和美教授に原稿をお願いしました。

### F. コロナ秀歌、秀句、川柳

### 情報提供協力者

笹月健彦(九州大学名誉教授)：免疫

黒木亜紀(昭和大学腎臓内科講師)：免疫

廣田和美教授(弘前大学麻酔科教授)：感染者の手術

コロナウイルス arXiv は、『山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「山中伸弥コロナ」で検索）』に転載されております。その他、「21 世紀構想研究会」、「医学開成会」のホームページでも読めます。

- コロナウイルス arXiv の転送は自由です。

### お知らせ(広告)

岩波新書から『知的文章術入門』という本を出します。(9月17日発売。946 円)。内容は、中公新書『知的文章とプレゼンテーション』と慶応大学理工学部1年生への「これから一生レポートを書き続ける君たちへ」という講義をもとにしています。

読みやすい本ですので、文章の書き方を正式に教わっていない学生諸君、教わらないまま卒業した社会人向けに書きました。ご推薦いただければ幸いです。



はじめに

第1章 日本語を大切に

第2章 わかりやすい文章を書こう

第3章 さあ、書きはじめよう

第4章 情報を探す、賢く使う

第5章 パワポでプレゼン、オンラインで授業

第6章 英語を学ぶ

第7章 英語を読み、聞き、話し、書く

第8章 英語でメールを書こう

おわりに

参考文献、索引

QR コードから、岩波書店のページに入り、「試し読み」をクリックすると、「はじめに」、「目次」、「第1章(一部)」が読めます。



### A. ワクチンのブースター効果

CoV-2 が次々に変異し、ワクチンが普及するなか、多くの人の関心は、ワクチンと変異ウイルスに向けられている。最初に、ワクチンのブースター効果について、現在の知見をまとめて紹介する。


## (1) ワクチンの持続性とブースター

### ワクチンの持続性

われわれは、ワクチンを打てば「二度と罹らない」と教えられている。しかし、すべてのワクチンが、天然痘、麻疹、おたふく風邪、水ぼうそうのように、終生にわたる免疫をもつわけではない。インフルエンザワクチンは毎年、肺炎球菌ワクチンは5年に1回注射が必要である。COVID-19に関しては、最初のワクチンを受けた人は、2020年12月であるので、まだ10カ月も経っていないので、どのくらいもつのか答えは出ていない。

一般的に言えば、ワクチンの持続性を決めているのは、ワクチンによって活性化された抗体産生細胞（B細胞）とキラーT細胞、そしてそれらのメモリー細胞の持続性である。天然痘の生ワクチン（痘瘡）の場合、抗体産生は30年以上保たれているが、キラーT細胞のメモリー細胞は、8-15年の半減期で減少する（図1）。COVID-19ワクチンのなかでも、mRNAワクチン、DNAワクチン、不活化ワクチンのような種類によって、免疫系の反応は大きく変わるはずである。

図1 天然痘ワクチン（痘瘡）の持続性。抗体価は30年以上にわたり維持されているが、細胞性免疫のキラーT細胞のメモリー細胞（CD4とCD8の二種がある）は、8-15年の半減期で減少する。免疫学の教科書から（1）。



### ブースター


時間と共に、免疫力が低下したとしても、ブースターとして、2回、3回と追加してワクチンを接種すると、それに反応して、抗体価が上がることはよく知られている。前図と同じ教科書には、ブースターにより、2回目に200倍近く、3回目に10倍上昇する例が示されている（図2）

図2

ブースターの効果。上は抗体のレベル。下は抗体の親和性。第1回接種後4週間、6週間後にブースター接種を行うと、IgG抗体価(上)、抗体の親和性(下)は、著しく上昇する。縦軸は対数値であることに注意。IgMには大きな変化はない。ここで使われているワクチンの詳細は、教科書に記載がない(1)。

### mRNA ワクチンブースター承認

2021年4月1日、ファイザーの Bourla CEO は、mRNA ワクチン2回接種後1年以内にブースターとして3回目の接種を受けると発表された(2)。2021年8月FDAとCDCは、デルタ株の蔓延を考慮して、PfizerとModernaのmRNAワクチンのブースター接種を承認した(3)。




### (2) イスラエルのフィールド実験

#### デルタ株の猛威

イスラエルは世界でもいち早く、mRNA ワクチン(ファイザー)の接種を終えた国である。そのイスラエルで、デルタ株がぶり返した(図3)。その分析から、ファイザーmRNAワクチンのデルタ変異ウイルスに対する感染予防力は2/3(64%)まで落ちているが、入院が必要になるような重症化(死亡も含む)は、十分に効果があることが分かった(図4, arXiv30の図の再掲)。ワクチン接種者がデルタ株に感染する Breakthrough infection が、30%というのも、イスラエルの例と一致している。しかし、アルファ株(イギリス型変異)には、依然として有効である。

図3

イスラエルの感染者数(人口100万人あたり)。ワクチンの効果で6月前後には感染は激減したが、夏頃からデルタ株によ



り、急増した。ただし、死亡者はそれほど増えていない（致死率 0.4%）。Our world in data

図4


イスラエルの Pfizer mRNA ワクチンの感染予防、および入院予防効果。Alpha 型と比べて delta 型に対しては、感染予防効果が低い。

Conf: Confirmed infection (PCR 確認感染)

Symp: Symptomatic disease (有症状患者)

Hosp.: 入院患者 (死亡者を含む)

資料、CDC パワーポイント (arXiv30 図2)




### ブースター効果

ブースター接種の効果は、主として血液中の抗体の測定結果であった。本当に、感染、特にデルタ型の感染を抑えているかどうかは、“Real world”,すなわち、現実の社会で生活している人たちに対して効果があるかを調べないと分からない。

イスラエルは、mRNA ワクチンの野外実験の場となっている。ファイザーワクチン接種にもかかわらず、デルタ株の流入により、感染者が急速に広がり始めた（図3）。イスラエルは対策として、7月31日から60歳以上を対象に3回目のブースターワクチンの接種を始めた（4, 5）。イスラエル健康省の分析によると、三回目のワクチンの接種12日後には、感染リスクは15倍以上低下した（図5）。住所患者は15倍以上減少した。これを受けて8月29日からイスラエル政府は12歳以上の国民へのブースターを行い、すでに200万人以上が終えているという。ブースターの効果がどのくらい続くかはまだ分かっていない。

図5

ブースターの感染予防効果。イスラエルの2回接種済み高齢者（60歳以上100万人）に、3回



目のブースター接種後の感染予防効果。図の縦軸は、2 回接種者の平均値を 1 としたときの感染防御効果。横軸はブースター接種後の日数。12 以降感染予防効果が明らかになり、16 日目には 10 倍を超えている。

なお、ファイザー社は、ブースターの安全性の第 1 相試験を行い、安全性と抗体価の上昇を確認している (6)。

### (3) DNA ワクチンもブースターが効果的

AstraZeneca (以下 AZ)、Johnson & Johnson (以下 JJ) のアデノウイルスを運び屋に用いた DNA ワクチンも、ブースターの臨床研究を進めている。いずれも 3 回目 (AZ)、2 回目 (JJ) ワクチン接種が、抗体価を大きく上昇させると発表した (いずれも論文はまだ)。

### (4) mRNA ワクチンと DNA ワクチンの併用効果 (heterologous prime-booster vaccination)

代表的なワクチンである mRNA ワクチンと DNA ワクチン (AZ ワクチン) を併用したらどうなるであろうか。2 種類のワクチンを使うプロトコル (heterologous prime-boost vaccination) が検討されているのには、二つの理由がある。一つは、エボラ出血熱の際に実際に応用されていることである。二番目の理由は、AZ ワクチンの副作用問題である。特に、AZDNA ワクチンによる血栓のリスクを軽減する方法の一つとしてヨーロッパ各国が、ワクチンの新たなプロトコルを探っているという事情がある。

スペインの研究はまだスペイン語のオンライン発表であるが、Nature はその概略を伝えている (7)。最初に AZ ワクチンを受けた 663 人の 2/3 に、8 週間後、mRNA ワクチンを投与した。残りの 232 人にはなにも注射しなかった。抗体価は、ブースターとして mRNA ワクチンを受けた人で上昇していた。しかし、この研究では、mRNA ワクチンを 2 回受けた人、AZ ワクチンを 2 回受けた人と比較していない。

イギリスの研究は、830 人の被験者について、28 日の間隔をおいて、prime-booster ワクチンの接種を行った。効果の判定は抗体と T 細胞の反応で見ている (8)。その結果、

IgG レベルでは、 BNT/BNT > AZ/BNT > BNT/AZ >> AZ/AZ

T 細胞レベルでは、AZ/BNT > BNT/AZ > BNT/BNT > AZ/AZ

(BNT: BioNTech/Pfizer mRNA ワクチン、AZ: DNA ワクチン)

このデータを見ると、AZ/BNT が AZ/AZ よりも優れているのは確かである。しかし、BNT/BNT は、かなり効果があるので、mRNA ワクチン (BNT あるいは Moderna) の 2 回接種を受けたわれわれは、ブースターとして AZ のワクチンを受ける必要はないであろう

## B. Dream Vaccine


現在の変異型コロナウイルスだけでなく、これから現れるかも知れない、すべてのコロナウイルスに効くような「Dream vaccine」ができれば、パンデミックを収束に向かわせることも可能であろう。Science 誌の The Dream vaccine という記事 (9) によると、2017 年、アメリカの 3 人のワクチン研究者が SARS にも MERS にも、その他のコロナウイルスにも効く Dream vaccine の研究費を NIH (NIAID) に申請した。しかし、審査員は Outstanding と評価しながらも、わずか 3 年後にこのような状況になるとは想像もできず、優先順位は低いと判断した。しかし、状況は変化した。2020 年 11 月、その申請に対して「Emergency Award」が送られた。

Dream vaccine を作るのは、インフルエンザやエイズのワクチンに比べればやさしいはずだとワクチン科学者は考えている。たとえば、いろいろな種類のコロナウイルスのレセプター結合部位を含む『モザイクワクチン』を作れば、非常に幅広いコロナウイルスにも効くはずである (10)。実際、そのようなモザイクワクチンが CalTech のグループから発表された。

8 月 18 日の NEJM に載ったシンガポール国立大学 (SNU) の論文は Dream vaccine が実際に作成できることを示唆している。2002 年～003 年に SARS に 8000 人が感染し、700 人が死亡した。SARS の流行に見舞われたシンガポールには、SARS の生存者がいる。そのような生存者の血清を調べたところ、20 年近く経った今も SARS ウイルス (SARS-CoV-1) に対して働く抗体を維持していた。それだけでなく、その血清は、COVID-19 のウイルス CoV-2 (正式には SARS-CoV-2) に対しても、コウモリのウイルスに対しても効果があった。このことから、著者は 汎 Sarbecovirus 中和抗体 (Pan-Sarbecovirus neutralizing antibodies) と呼んでいる。

Sarbecovirus とは、あまり使われない名前だが、SARS, MERS, CoV-2 を含むコロナウイルスの系統である (図 6. 図中の alpha,beta,delta,gamma は、CoV-2 の変異株の名前ではなく、それ以前から使われていたコロナウイルスの系統名であることを注意)。

図 6  
コロナウイルスの系統図  
(10)。大きく、*alpha,beta,delta,gamma* の 4



つ系統に分かれる (変異株ではないことに注意)。この系統のなかで、人の顔の7つのウイルスがヒトに感染性をもつ。そのうちの SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV がヒトに強い病原性をもつワル3兄弟である。残りの4つの人の顔で示したウイルス株は、感染しても、風邪程度の症状で済む。他のウイルス株 (●で示す) は、人以外の動物に感染する。

実験の結果をまとめた図 7 は複雑であるが、内容は簡単である。図の上を書いてあるのは血清を採取した人の説明である。左から示そう。


SARS-CoV-1-Patient : SARS に感染したヒトの血清

SARS-CoV-2-Patient : COVID-19 に感染したヒトの血清

Healthy-vaccinated: COVID-19 ワクチンを受けた未感染者の血清

SARS-CoV-2-vaccinated : COVID-19 ワクチンを受けた COVID-19 感染者の血清

SARS-CoV-1-vaccinated : COVID-19 ワクチンを受けた SARS 感染者の血清



それぞれのパネルのなかの縦のレーンは、検査を行ったウイルスである。10種類あるが、3グループに分けられる。左端、ブルーの枠の4つは SARS-CoV-2 とその変異株 (Alpha, Delta, Beta)、中央のグリーン枠の5つはコウモリとセンザンコウのウイルス、右端の赤枠は SARS-CoV-1 である。

左端のパネル (SARS-CoV-1-Patient) と右端のパネル (SARS-CoV-1-vaccinated) を比較してみよう。SARS-CoV-1、つまり SARS 生存者は 20 年近く経っても、SARS-CoV-1 ウイルスとコウモリのウイルス (赤枠) を中和する抗体を持っている。SARS 生存者に COVID-19 抗体を打つとすべてを中和することができる。

このデータから、Dream vaccine の戦略が見えてくる。第一に SARS 生存者の抗体を設計する。ゲノム情報などがそろっているため、それほど難しくはないだろう。それに、現有

の mRNA ワクチンなどを合わせた「混合ワクチン」をつくれればよいのだ。すでにどこかで研究が始まっているかも知れない。Dream vaccineこそ、パンデミックを救う『銀の弾丸』となるであろう。

## C .ワクチン接種は努力義務

ワクチンは、個人を守り、加増を守り、社会を守るという大きな役割がある。それなのに、政府は、ワクチンを打ちたくない人は打たなくてもよいと繰り返し、注意を呼びかけている。たとえば、厚労省の接種についてのお知らせには、強制ではない、強制してはいけないと、書いてある。

新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

予防接種法の条文を調べたところ、ワクチンは「努力義務」と書いてあった。努力すべき義務なのだ。

### （予防接種を受ける努力義務）

**第九条** 第五条第一項の規定による予防接種であつてA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であつてA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種（同条第三項に係るものを除く。）を受けるよう努めなければならない。


- 2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であつてA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種（第六条第三項に係るものを除く。）を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ウィキペディアによると、1948年までは「罰則規定ありの義務接種」であったのが、1976年には「罰則規定なしの義務接種」となり、1994年からは「努力義務」となった。

その背景には、感染症の減少と副作用に対する損害補償の増加がある。しかし、デルタ株により集団免疫が不可能になった今（図 8）、COVID-19 に対しては、「義務化」する以外に流行を納めることはできないであろう。

少なくとも、努力するべき義務であることを強調してほしい。しなくてもよいようことを強調する表現は、ワクチンに対するネガティブキャンペーンとしか思えない。

図 8  
 デルタ株の基礎再生産数は 5.0-9.5 といわれている (CDC, arXiv30)。天然痘よりも感染しやすく、水ぼうそうと同じ程度の感染力に対しては、集団免疫の達成は不可能であろう。



#### D. 億単位のワクチンをどのようにして作るのか。

ワクチンで COVID-19 を抑えようとする、地球上の人間、70 億人に対して、少なくともその 70%、50 億人分のワクチンを用意しなければならない。一人 2 回接種すると 100 億回分になる。どうしたら、そんな数のワクチンを作ることができるのか、実験室で、細々と実験をしていた人間にとっては想像もできないことである。NYTimes が、ファイザーワクチン製造過程をやさしい記事にまとめているので、それにしたがって、ワクチン製造の現場を訪ねてみよう (11)。

ワクチンを作るには、60 日かかるが、その半分の時間は、品質の確認テストに充てられる。その過程は、工場ごとに大きく 3 つのステップに分けることができる。それぞれのステップは、アメリカ中部から東部にあるファイザーの工場で行われる。ヨーロッパでは、ドイツとベルギーの工場が担当する。ワクチンづくり最初の過程は、ミズーリ州セントルイス郊外のチェスターフィールド (Chesterfield) にあるファイザーの工場が始まる (図 9)。




図9

ファイザー・ビオンテックワクチンは図に示した5つの工場のチームプレイで進められる。(11)を基に作成。

図10

ファイザー・ビオンテックワクチンの大量生産過程。本文参照。(11)を基に作成。

### ステップ1. (Chesterfield, MO)


スパイク遺伝子 (DNA) を組み込んだプラスミド (細菌に感染して独立して増えるウイルス) を大腸菌に感染させて増やす。大腸菌は20分で倍になる。ちいさなバイアル1本から、4日間で5000万回分のワクチンに必要な分のスパイクDNAができる(図9)。

プラスミドからスパイクDNAを酵素によって切り出し、遺伝情報が変わっていないことを確認する。このプロセスに2日が

必要である。1500万回分のDNAの入った1リットル瓶は凍結されて、次の工場へと送られる。ここまでの、チェスターフィールド工場の仕事である。

### ステップ2. (Andover, MA ; Mainz, Germany)

スパイクDNAは、ドライアイスでマイナス20度に保って、ボストン郊外のアンドバー (Andover) とビオンテック(ドイツ、マインツ)に送られ、mRNAの調整へと進む。まず一連の反応により、DNAからmRNAを転写する。ワクチン用のmRNAとしての品質を慎重に検査する。一部は、チェスターフィールドにも送られ、品質を確認する。7500万人分が一つのロットとなる。Andoverの工場では、1週間に、2ロット(1億5000回分)の製造能力がある。ワクチン製造のために、今度はミシガン州のカラマズー (Kalamazoo) に送られる。NYTimesの記事には書いてないが、mRNAワクチン可



能にした Pseudouridine は、この過程で、反応液のなかに加えられているはずだ。

図 10

DNA から mRNA を転写し、mRNA を大量に作る装置 (11)。大学の研究室の実験とあまりにもスケールが違うのに驚く。



### ステップ 3 (Kalamazoo, MI; Puurs, Belgium)

Andover から届いた mRNA は、ミシガン州のカラマズー (Kalamazoo) の工場では、最後の仕上げにより、ワクチンとなる。リピドの溶液と mRNA が混ぜ、電気をチャージすると、mRNA は数層のリピドに包まれる。不純物を取り除き、滅菌したあと、バイアルに詰められる。

バイアルそのものも慎重に検査される。1本のバイアルにつき、13のカメラで100枚以上の写真を撮って、破損、破片の入った瓶は除かれる。バイアルには6回分、0.45mlのワクチンが注入され、紫色のキャプをかぶせる。このプロセスに46時間かかる。1分間に575のバイアルを生産できる。バイアルは、2日かけて、マイナス70度に冷却され、さらに4週間のテスト期間を経て、出荷される。

チェスターフィールドからマインツに送られたワクチン DNA は、同じようなプロセスを経て、ベルギーのブリュッセル郊外のプール (Puurs) で製品化される。普通に考えると納得がいかないのだが、ベルギーで作られたファイザーワクチンの配分先を決めるのは EU であるという。このため、日本は、輸入するにあたっては、EU と交渉しなければならなかった。

### 引用資料

- (1) Murphy, K. Immunobiology Garland Science
- (2) coronavirus vaccine tracker NYTimes <https://www.nytimes.com/interactive/2>
- (3) [Pfizer and BioNTech Announce Submission of Initial Data to U.S. FDA to Support Booster Dose of COVID-19 Vaccine | Pfizer](#)
- (4) Vogel, G. Science doi: 10.1126/science.acx9007
- (5) [files\\_publications\\_corona\\_booster-27082021.pdf \(www.gov.il\)](https://www.gov.il/files_publications_corona_booster-27082021.pdf)
- (6) <https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-submission-initial-data-us-fda>

- (7) [Mix-and-match COVID vaccines trigger potent immune response \(nature.com\)](#)
- (8) [Mixed Oxford/Pfizer vaccine schedules generate robust immune response against COVID-19, finds Oxford-led study | University of Oxford](#)
- (9) [Vaccines that can protect against many coronaviruses could prevent another pandemic | Science | AAAS](#)
- (10) [Mosaic nanoparticles elicit cross-reactive immune responses to zoonotic coronaviruses in mice \(science.org\)](#)
- (11) [How Pfizer Makes Its Covid-19 Vaccine - The New York Times \(nytimes.com\)](#)

#### D. COVID-19 感染者の手術は直ぐにはできない。コロナ診断後 7 週間待つ。

弘前大学大学院医学研究科麻酔科学

廣田和美

COVID-19 の感染者の手術を何時行うべきかの大規模調査が多施設国際共同研究で行われました。世界 116 か国の 1674 病院が参加し（日本からも 50 病院が参加）、140,231 人の手術患者データ(内 COVID-19 患者は 3127 人)を集めて解析されました。その結果が 3 月 9 日に英国の"Anaesthesia"誌に掲載されましたので、要約を紹介します(1)。

##### 感染後 7 週間までは、術後死亡率が高い

すでに、手術前、手術後に SARS-CoV-2 に感染すると、術後の死亡率を上げることが知られています。この研究では COVID-19 既往患者は感染の確定診断後に、どの程度の期間を空けると安全に手術が出来るかを調査することを目的としました。

非 COVID-19 患者の術後 30 日内の死亡率は 1.5 (95%CI: 1.4-1.5)でした。これに対して、COVID-19 既往患者の 30 日内の非感染者に対するオッズ比は：

- ・ 感染の診断から 0-2 週間：4.1 (95%CL;3.3-4.8)
- ・ 3-4 週間：3.9 (2.6-5.1)
- ・ 5-6 週間：3.6 (2.0-5.2)
- ・ >7 週：1.5 (0.9-2.1) (非感染者と有意差なし)

でした。

高齢者(70 歳以上)でも非高齢者でも、術前合併症 (ASA 分類で 3 以上は重度合併症有)の有無、手術内容が侵襲的か非侵襲的か、定時手術か緊急手術かに関係なく、感染から 7 週以


上過ぎていれば、オッズ比は非感染者と同じになることがわかりました。もちろん、高齢者、術前合併症あり、緊急手術患者の方が、術後30日死亡は高いですが、同じカテゴリー内では感染から7週を過ぎれば、COVID-19による術後30日死亡への影響はなくなります。

### 無症状感染者でも7週間までは術後死亡率が高い

無症状感染患者、症状はあったものの回復した患者、症状が継続している患者に分けて解析してみても、図1に示すようにどの群でも7週以上の患者は極端に術後30日死亡が低い結果です。驚くべきことは、無症状患者でも、感染から7週を過ぎていなければ、術後30日死亡が有意に高い点です。この理由としては、最近の研究で、SARS-CoV-2のスパイク蛋白が、痛みを感じさせる VEGF-A/neuropilin-1 受容体を抑制することで、痛みが鈍感になる事が、感染しても

無症状である一因であるとされています(2)。つまり、無症状でも、病状はある程度進行しているため、それなりのダメージが生体にあってもおかしくないということかと思えます。また、症状が残っている場合には、術後30日死亡が増えるので、症状が落ち着くまで待てればその方が良くしています。

図1. 症状別、COVID-感染既往患者の感染からの期間と術後30日死亡率との関係



### 術後肺合併症のリスクも、感染後7週間までは高い。

術後30日での肺合併症の発症も、やはり感染から7週過ぎれば非感染者と同じになります。そして、これは、症状の有無に関係なく、感染から7週以内は術後肺合併症リスクが高くなります(図2)。そして、術後30日死亡と同様に、無症状患者でも、感染から7週を過ぎていなければ、術後30日肺合併症は有意に高いです。実際、無症状でも、肺病変がある程度進行していることは報告(3)されており、手術侵襲が加わることで、肺障害が進行することは当然あり得ることです。また、症状が残っている場合には、無症状または回復患者に比べ、術後30日肺合併症リスクが高いので、呼吸器症状が落ち着くまで、手術を待つ方が望ましいと言えます。




図2. 症状別、COVID-19感染既往患者の感染からの期間と術後肺合併症との関係

以上より、日本麻酔科学会では、「待機可能な手術はCOVID-19感染診断から7週目以降に予定することを推奨する。その時点でCOVID-19関連症状が継続している場合には、手術の至適時期と手術リスクについて慎重に考慮する。」という提言をホームページ上で公開しました< [COVID-19感染既往患者の待機手術再開時期に関する提言.pdf \(anesth.or.jp\)](https://www.anesth.or.jp/)>。

## 引用文献

1. COVIDSurg; Anaesthesia 2021; 76: 748-58.
2. Moutal A, et al. Pain 2021; 162: 243-52.
3. Meng H, et al J Infect 2020; 81: e33-e39.

## D. コロナ秀歌、秀句、川柳

朝日歌壇、朝日句壇 8月1日から9月5日収録朝日川柳：7月27日から9月4日収録

観客のいないコンクール会場で奏者を鼓舞する 審査員の拍手 (北九州市) 福吉真知子	アルコール消毒薬を荷揚げする尾瀬の歩荷(ぼっか) にただ頭下げ (東京都) 大塚 陽子	ゲストらは観客ではないという論理コロナウイルスにはとうじはしない (東京都) 野上 卓	十葉の花咲く庭はひっそりと妻と会えないコロナ禍続く (さいたま市) 吉田 俊治	本日は泊まりで飯盒炊爨(はんごうすいさん)の林間学校の弁当詰める (奈良市) 山添 聖子	トーチキス走らぬ聖火ランナーの精一杯の笑顔かなしも (高岡市) 池田 典恵	居酒屋の店主に罪のないごとく五輪選手にも罪はないのだ (東京都) 浅倉 修	知らぬ間に今日もどこかであるらしきトーチキスとう秘密の儀式 (鎌倉市) 小笹岐美子	江戸っ子は集団免疫できました緊急事態という言葉には (三鷹市) 山縣 駿介	入国もできぬ外国の選手いて開催間近なコロナ下五輪 (石川県) 瀧上 裕幸	人通り減りて売り上げ激減するも「ビッグイシュー」の販売に立つ (江別市) 成田 強	従わぬ飲食店(みせ)とは取引するなとまで言う政権が作る分断 (京都市) 森谷 弘志	ワクワクし穂高に登る夢をみるコロナ禍のなか今日もリハビリ (ふじみ野市) 高橋 正幸
---	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---

打ち上げ場囲む沼辺に蒲繋り花火大会今年も中止 (浜松市) 桜井 雅子	アスリート心を奪う活躍のそのひと時やコロナはコロナ (横浜市) 一石 浩司	隈(くま)さんの空席目立たぬ椅子の色皮肉にもコロナで役立てり (船橋市) 佐々木美彌子	コロナ下で敢えて奸活せし嫁と産まれ来し子に月桂樹植う (西尾市) 丸山富久治	「オリンピック観るくらいなら眠りたい」現場の激務を語る看護師 (観音寺市) 篠原 俊則	オリンピックは一切観ないと前見つめ医師は重たき声で言い切る (柏市) 浅利 早苗	反対も応援もしたいジレンマを矛盾と言うならそもそものが矛盾 (川崎市) 川上美須紀	元号を四つ生きたる果てに見せて貰える大賭博五輪 (我孫子市) 松村 幸一	選手らを全力応援するわれは今も開催に反対のわれ (相模原市) 石井 裕乃	福島も広島、長崎、コロナ禍も五つのまるにかすみてゆけり (豊川市) 宇佐美幸枝	大学の調理実習距離保ち切干大根おやきを作る (富山市) 松田 わこ	効いている証拠と吐き気を紛らしたコロナワクチン接種後二時間 (津市) 土屋太佳子	改札口に孫抱きしめる景を見ず疫禍ながびく八月の駅 (仙台市) 沼沢 修	ワクチンをヴァイオリニストは腰に打つ腕も楽器の一部であれば (札幌市) 住吉和歌子	感染とオリンピックは別物と誰も思わず医療崩壊 (秋田市) 小松 俊文
---------------------------------------	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--------------------------------------	---	--	--	---------------------------------------

ウイルスに勝てない証 観客のいない五輪の開  
会式は (観音寺市) 篠原 俊則

声を掛け白杖の人と歩きおりコロナ・熱中症を  
こもこも語る (町田市) 山田 道子

ワクチンの副反応の熱を病む身体がなれば抗体つくれ  
(さいたま市) 松田 典子

酒出せぬ緊急事態の居酒屋でやけに目につくア  
ルコール液 (川崎市) 後藤 文彰

運動会冠婚葬祭奉仕作業村を簡素化してゆくコ  
ロナ (滋賀県) 木村 泰崇

2日間の熱が下がってコンビニへ出かけて気づ  
くセミたちの声 (富山市) 松田 わこ

ペンじゃなくシャーペンで書く8月の予定は未  
定に近い約束 (富山市) 松田 梨子

不人気の五輪のグッズ意外にも完売続出論と  
うらはら (横須賀市) 鈴木 信子

金網と六万人に警備され復興はならずコロナに  
も負け (東京都) 佐倉 清一

コロナ禍は人間界の事象にてあたり一面ヒマワ  
リ畑 (刈谷市) 馬場 泰年

二年(ふたとせ)で十四箱と三十枚買って捨てたる不織  
布マスク (ふじみ野市) 片野里名子

「普通はやらない」オリンピック始まりぬ六万  
八千のイスに見守られ (宮城県) 中松 伴子

保育園へ迎えの行った時のごと抱きついてきて  
子は退院す (湖西市) 佐藤きみ子

思い切りここを先途(せんど)と啼く蟬に人新世など  
知ったことかよ (掛川市) 村松 建彦

**コロナ秀句**

ワクチンを打たぬも勇氣蠶(ひきがえる)  
(東松山市) 小熊なが子

まだ鳴かぬ蟬に禍ありしかと  
(高松市) 和泉 金子

香水に遠く暮らしてナースたり  
(神戸市) 池田雅かず

マスクなきは遺影のみなる夏の葬  
(下田市) 森本 幸平

炎天下顔に貼りつくマスクかな  
(長崎市) 下道 信雄

接種終え命惜しむや蟬しぐれ  
(横浜市) 細野八重子

人流といふ語訝(いぶか)し夏の暮  
(横浜市) 穴沢 秋彦

駆(か)け抜けし東京五輪夏の果て  
(別府市) 梅木兜士彌

**コロナ川柳(三十二)**

夏まつり天を見上げしコロナの日  
岡山県 田口 綾野

空耳か ふと「懸念する」と聞こえたが  
東京都 越後 正

反対とあれほど嫌った五輪見る  
茨城県 加納 橋夫

現実に引き戻される過去最多  
徳島県 井村 晃

人流が減ったと見える不思議な眼  
兵庫県 河野 敦

底なしの感染拡大「そこはない」  
岩手県 佐々木紀明

アナウンサー飛沫の量は増すばかり  
大阪府 玉田 一成

この博打やればやるほど負けが込み  
埼玉県 西村 健児

若者の怖くないよに怖くなり  
群馬県 樺澤 信雄

2回目の前に勧める3回目  
宮城県 鈴木 正

歓喜の聲 辛苦のベッド  
茨城県 五社 蘭平

金メダル タイタニックに積み上げて  
広島県 高橋 滋

崩壊を自宅療養と言いつれ  
東京都 村田 正世

鉄面皮患者切り捨ての策に出る  
神奈川県 大坪 智

並ばせてやってくる感を出す都知事  
大阪府 村松 則康

棄民する国なりコロナもアフガンも  
静岡県 飯田 健彦

普通の日つくづく欲しいと蟬も鳴き  
奈良県 島田 良

必要とする人がいるわからぬか  
青森県 大橋 誠

蟄居して少ないと知る真の友  
千葉県 安延 春彦

ポケモンの一様のような変異株  
大阪府 吉村 治美

懼っても自助です五輪は続けます  
 東京都 土屋 進一  
 ついに出来たコロナ滞在死の勧め  
 愛媛県 木村 瞳  
 難しいことは地方へ投げてやる  
 栃木県 井原 研吾  
 総理即自宅療養させなさい  
 奈良県 横井 正弘  
 耳打ちすアベちゃん逃げた日もうすぐよ  
 岡山県 木田 昌  
 有観客に見える座席の先見性  
 千葉県 石見 孝男  
 息できる人は自宅の恐ろしさ  
 東京都 内田 昌廣  
 言うなれば汝人民家で死ぬ  
 兵庫県 大西 哲生  
 Amazonに酸素ボンベはあるのかな  
 埼玉県 山口 尚孝  
 言っとくよ 自宅療養  
 あなたもよ  
 大阪府 緒方よしこ  
 「これまでに経験のない」無策かな  
 千葉県 高師 幸広  
 煮沸して天日干しする金メダル  
 宮城県 田所 純一  
 御礼にとパツハ茶番の章贈り  
 三重県 山本 武夫  
 その国のコロナ禍が待つ選手たち  
 福島県 山口ちい子  
 入院は喜ぶべきか手遅れか  
 千葉県 田中 文雄  
 子ら飛んで火にいる愚策やめるべし  
 茨城県 鈴木 静枝

それにしても祭りの後のひどいこと  
 埼玉県 椎橋 重雄  
 各人が命守れとテレビ言う  
 広島県 梶本 彌生  
 泥縄で繕う酸素ステーション  
 東京都 三井 正夫  
 目先しか見えなかったんだやっぱりね  
 茨城県 杉原 正一  
 発出が目的と化す無政策  
 東京都 田中 茂明  
 全力で神風だけを待っている  
 奈良県 金 昌則  
 桁違いなのに施策は同じ桁  
 愛知県 牛田 正行  
 たつぷりとあった宿題する時間  
 大阪府 小山 安松  
 もう無理よ小さな器に水溢れ  
 神奈川県 砂山 拓三郎  
 要するに五人でメシを食ったんだろが  
 福岡県 伊佐 孝夫  
 国会も開けぬ臆病者の夏  
 埼玉県 西村 健児  
 足りぬもの酸素にベッド爺(じじ)の覇気  
 神奈川県 雪本 純一  
 千人に驚くうぶな日もあった  
 大分県 大杉 至  
 パラバラと少国民を動員し  
 東京都 鈴木 英人  
 ワクチンも3回目にはそっと受け  
 埼玉県 高橋 伯明  
 酒ならば金箔入りも乙だけど  
 東京都 松野 修

裏切りの宴会救急呼んでばれ  
 東京都 大和田淳雄  
 来るまでは救急だった救急車  
 千葉県 姫野 泰之  
 金魚さえ酸素あるのに俺にない  
 山形県 渡部 米助  
 今ならば「もつと酸素を」ともゲーテ  
 東京都 後藤 克好  
 ぼんやりと見ていただけの導火線  
 大阪府 渡辺たかき  
 どこ逃げた「不安あおるな」言っただけ  
 神奈川県 岡 順二  
 「危機感を共有」だけで仕事済み  
 東京都 内田 昌廣  
 山登りコロナ忘れて進む道  
 神奈川県 高田 航大  
 ディスタンス山の虫ならよるこんで  
 京都府 藤田 翼  
 山おどろく祝日変わる五輪にて  
 愛知県 山田 千葡  
 病院も見えぬ野戦のごとき首都  
 神奈川県 一柳 直貴  
 じゃああなた医者になればと言ってみる  
 岐阜県 佐古 鈴子  
 観戦が感染をよぶをいかにせむ  
 神奈川県 佐藤 亮子  
 意味不明スタンドブレイの丸川氏  
 神奈川県 肥海 昭男  
 教えてよといった明かりどこにある  
 東京都 浜島裕美子  
 首相には見える明かりは狐火か  
 岡山県 藤井 信哉